

◎ベリチーム配合顆粒 [内]

【重要度】 【一般製剤名】 1g 中濃厚パンクレアチン 312.5mg, ビオチン 75mg, リパーゼ AP6 62.5mg, セルラーゼ AP3 37.5mg 【分類】 消化酵素剤

【単位】 ◎g

【常用量】 1.2～3g/日

【用法】 分3 食後

【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【保存期腎不全患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【特徴】 でんぷん、蛋白質、脂肪及び繊維素を分解する 4 種の酵素を胃溶性と腸溶性の顆粒に分けて配合した消化酵素剤。

【主な副作用・毒性】 くしゃみ、流涙、皮膚発赤 (パンクレアチンによる)

【備考】 ウシ又はブタタンパク質に対し、過敏症のある患者には禁忌。

【更新日】 20190304

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。