

◎プロスタンディン軟膏 [外]

【重要度】 【一般製剤名】 アルプロスタジル (U) alprostadil 【分類】 褥瘡・潰瘍治療剤

【単位】 ◎10g/本 [0.003%]

【用法】 消毒後に1日2回、適量塗布

【特徴】 末梢血管拡張・血小板凝集抑制・赤血球変形能の改善・活性酸素産生抑制等の作用により、血流量を増加させ、末梢循環障害を改善する。

【主な副作用・毒性】 疼痛、刺激感、CRP 上昇、出血創には禁忌（出血を助長）

【排泄】 尿中回収率9.7% [ラット] (1)

【MW】 354.48

【pKa】 5.02 (1)

【相互作用】 抗血小板剤、血栓溶解剤、抗凝血剤とは併用注意 (1)

【備考】 熱傷潰瘍に本剤を使用する場合、本剤の対象は熱傷後の二次損傷により生じた熱傷潰瘍であるので、新鮮熱傷に対して他の適切な療法を考慮すること。禁忌：重篤な心不全がある患者。出血している患者。妊婦または妊娠している可能性のある患者（子宮収縮作用が認められているため）

【更新日】 20121010

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。