

## ▼ステリハイドL液 [外]

【重要度】 【一般製剤名】 グルタルアルデヒド glutaral 【分類】 化学的滅菌・殺菌消毒剤

【単位】 ▼500mL/本 [2%]

【用法】 ステリハイド液 2%1Lに対し、緩衝化剤 30mL を混和し、黄緑～淡黄色の液として用いる。体液等の付着した器具：1時間以上、体液等の付着しない器具：30min 以上浸漬

【特徴】 微生物もしくは有機物により高濃度に汚染された器具又は皮下組織、粘膜に直接適用される器具の化学的滅菌及び HB ウイルスの汚染が予想される器具の消毒に使用する。

【主な副作用・毒性】 皮膚に付着すると発疹、発赤などの過敏症状

【MW】 100.12

【備考】 ・人体に用いないこと（タンパク凝固性がみられるため）。・浸漬にはふた付き容器を用い、使用中はふたをすること。・炭素鋼製器具は24時間以上浸漬しないこと。

【更新日】 20121017

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。