

△つくしA・M配合散 [内]

【重要度】★★★【透析患者に投与禁忌】 【一般製剤名】特徴参照 【分類】健胃・消化剤

【単位】△g [1.3g/包]

【常用量】3.0～3.9g/日

【用法】分3食後

【透析患者への投与方法】長期投与によりアルミニウム蓄積によるアルミニウム脳症、アルミニウム骨症、貧血があらわれることがあるため禁忌 (1)

【保存期CKD患者への投与方法】減量の必要はないが、アルミニウムの長期曝露は避ける (5) 炭酸水素Naが含有されていることに注意 (1)

【特徴】1g中に炭酸水素ナトリウム600mg、炭酸マグネシウム120mg、沈降炭酸カルシウム300mg、乾燥水酸化アルミニウムゲル70mg、リカーゼ50mg、ケイヒ末20mg、ニガキ末10mg、シヨウキョウ末10mg、ウイキョウ10mg、カンゾウ末100mg、オウバク末9.5mgを含有

【主な副作用・毒性】Na負荷量が多くそれによる溢水、acid rebound、アルカローシス

【透析性】組織移行したアルミニウムは除去できない (5)

【更新日】20151130

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。