

○五苓散エキス顆粒 (17) [ツムラ] [内]

【重要度】 【分類】 漢方製剤

【単位】 ○2.5g/日

【常用量】 7.5g/日

【用法】 分2 または分3 [食前又は食間]

【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【保存期腎不全患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【特徴】 表に邪熱があつて裏に停水のあるものを治す効があり、口渇と利尿を目的として諸種の疾患に用いられる。口渇傾向の減少があつて水を飲むとすぐ吐き出し、また水を飲みまた吐くといった水逆の嘔吐にも効果ある。口渇、利尿の減少のあるもの、ネフローゼ、腎炎、心臓病、急性胃腸炎などに用いられる。

【主な副作用・毒性】 発疹、発赤、搔痒感など

【主な臨床報告】 気象性の頭痛の頻度や程度を軽減する効果 (Kudeken T, et al: Jpn J Headache 50: 709-720, 2024)

【備考】 アクアポリン4を閉じて、脳細胞への水移行を抑制する

【更新日】 20240918

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、

直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。