

△リボスチン点鼻液 [外]

【重要度】 【一般製剤名】 レボカバスタチン塩酸塩 (U) levocabastine hydrochloride 【分類】 アレルギー性鼻炎治療剤

【単位】 △15mL/本 (112 噴霧用) [0.025%]

【用法・用量】 1日4回, 1回各鼻腔に2噴霧ずつ噴霧吸入 [懸濁液のため使用前に容器をよく振る]

【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 減量の必要はないが排泄が遅延するため慎重投与 (1) 腎機能障害患者では半減期の延長 (経口投与), tmax の延長等がみられ, 腎障害により尿排泄が阻害され, 薬物の消失が遅延するものと考えられる (1)

【特徴】 第二世代の局所用 H1 ブロッカー, 肥満細胞からのケミカルメディエーター遊離抑制作用および好酸球遊走能抑制作用のいわゆる抗アレルギー作用を併せ持つ。

【主な副作用・毒性】 眠気, 頭痛, 鼻腔刺激感, 咽頭部痛, 咽頭部不快感, 嘔気, 好酸球増加など

【吸収】 鼻腔粘膜より吸収される (1)

【Tmax】 2.8~3.0hr (1)

【排泄】 腎排泄 (1)

【t1/2】 40~50hr (1)

【蛋白結合率】 54.7% (1)

【MW】 456.98

【透析性】 HD は薬物動態にほとんど影響を及ぼさない (1)

【更新日】 20141227

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。