

△大黃牡丹皮湯エキス顆粒 (33) [ソムラ] [内]

【重要度】 【分類】 漢方製剤

【単位】 △2.5g/包

【常用量】 7.5g/日

【用法】 分3 [食前又は食間]

【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【保存期腎不全患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【特徴】 一種の膠球血剤で、桃核承気湯証に似ていて、急迫症状は少なく、桂枝茯苓丸証に似ていてそれよりも実証で、便秘する者によい。腹診で下腹部に抵抗圧痛を証明し、便秘がある。フリーラジカル消去活性が漢方製剤中最も高いという。

【主な副作用・毒性】 食欲不振、腹痛、下痢

【更新日】 20121103

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。