

## ▼ アロテック吸入液 [外] 【製造販売中止】

【重要度】 【一般製剤名】 オルシブレナリン硫酸塩 orciiprenaline sulfate 【分類】 喘息治療・気管支拡張剤

【単位】 ▼2%

【用法】 1回1吸入。少なくとも4～6時間の間隔をあけて吸入を行う。

【透析患者への投与方法】 総クリアランスにおける腎クリアランスの寄与が低いため、減量する必要はない (5)

【保存期腎不全患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【特徴】 本剤は交感神経β受容体刺激剤で、選択的に気管支平滑筋に作用して気管支拡張作用をあらわす。心臓血管系に対する作用はイソプロテレンールより弱い。

【主な副作用・毒性】 血清K値の低下、心悸亢進、血圧変動、頭痛、振戦、発汗、神経過敏、悪心、気道刺激症状など

【排泄】 腎；尿中排泄率 約82% (1)

【蛋白結合率】 約10% (1)

【Vd】 530L (1)

【MW】 520.59

【透析性】 Vdが大きいため透析で除去されにくいと思われる (5)

【TDMのポイント】 TDMの対象にはならない

【CL】 985mL/min (1)

【効果発現時間】 直後～5min (1)

【効果持続時間】 5～7min (1)

【更新日】 20100927

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。