

△桂枝茯苓丸エキス顆粒 (25) [ツムラ] [内]

【重要度】 【分類】 漢方製剤

【単位】 △2.5g/包

【常用量】 7.5g/日

【用法】 分2 または分3 [(食前又は食間]

【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【保存期腎不全患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【特徴】 於血証を目標に用いる。腹診によって下腹部に抵抗のある部位を認め、この部に圧痛があれば於血証の目標とする。このような患者の腹部は一般に弾力に富んで、緊張のよいものが多く、貧血の傾向はなく軟弱無力のものは少ない。実証の更年期障害に、

【主な副作用・毒性】 発疹、発赤、掻痒感、肝障害、食欲不振、胃部不快感、悪心、下痢など

【更新日】 20210603

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。