

---

**△半夏瀉心湯エキス顆粒 (14) [ツムラ] [内]**

---

**【重要度】** 【分類】漢方製剤**【単位】** △2.5g/包**【常用量】** 7.5g/日**【用法】** 分2または分3(食前 又は 食間)**【透析患者への投与方法】** 常用量 (1)**【保存期 CKD 患者への投与方法】** 常用量 (1)**【特徴】** 心下痞硬、悪心・嘔吐、食欲不振を目標として用い、腹中雷鳴して下痢するものにも用いる。舌には白苔のあることもあり、ないこともある。アフタ性口内炎やベーチェット病などにも用いられる。**【主な副作用・毒性】** 間質性肺炎、偽アルドステロン症、ミオパシー、発疹、蕁麻疹など**【更新日】** 20151202

---

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。