
△真武湯エキス顆粒 (30) [ツムラ] [内]

【重要度】 【分類】漢方製剤**【単位】** △2.5g/包**【常用量】** 7.5g/日**【用法】** 分2または分3 [食前又は食間]**【透析患者への投与方法】** 減量の必要なし (5)**【保存期腎不全患者への投与方法】** 減量の必要なし (5)**【特徴】** 新陳代謝が衰えているために、水毒が胃腸に滞留して、腹痛、下痢を来し、あるいはめまい、心悸亢進などの症状を呈する者により。腹部は軟弱で時々ガスのために膨満し、脈は沈微または遅小弱、浮弱遅などを示し、倦怠疲労感がはなはだしく、手足が冷えやすく、あるいは悪寒があり、生気に乏しいものを目標とする。**【主な副作用・毒性】** 心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心など**【更新日】** 20160428

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。