
△二朮湯エキス顆粒 (88) [ツムラ] [内]

【重要度】 【分類】 漢方製剤**【単位】** △2.5g/包**【常用量】** 7.5g/日**【用法】** 分2～3 [食前又は食間]**【透析患者への投与方法】** 常用量 (1)**【保存期 CKD 患者への投与方法】** 常用量 (1)**【特徴】** 神経痛に、体力は中等度前後の人で、首から肩にかけて痛みがあるものに用いて効果がある。**【主な副作用・毒性】** 間質性肺炎、偽アルドステロン症、ミオパシー、肝機能障害**【備考】** 甘草を含むので低カリウム血症や血圧上昇に注意する。漢方製剤の併用では含有生薬の重複（特に甘草）に注意する。**【更新日】** 20151201

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。