

◎ウロカルン錠 [内]

【重要度】 【一般製剤名】 ウラジログアシエキス *quercus stenophylla extract* 【分類】 尿路結石治療剤

【単位】 ◎225mg/錠

【常用量】 6錠/日

【用法】 分3

【透析患者への投与方法】 減量の必要はないと思われるが、透析患者の投与方法に言及した文献なし (5)

【保存期腎不全患者への投与方法】 減量の必要はないと思われるが、腎不全患者の投与方法に言及した文献なし (5)

【特徴】 リン酸アルミニウムマグネシウムの結石を溶解。シュウ酸カルシウム、リン酸カルシウム結石もわずかに溶解。抗炎症作用や血管透過性亢進を抑制する作用もある。これらにより結石の尿道通過を容易にさせると考えられる。利尿作用、抗炎症作用、抗酸化作用、シュウ酸による細胞傷害抑制作用などが報告されている (森山学, 他: 泌尿器外科 24:1897-1902,2011)

【主な副作用・毒性】 胃部不快感、下痢

【TDMのポイント】 TDMの対象にならない

【更新日】 20120920

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。