

## ◎ヨーデルS糖衣錠80 [内]

【重要度】 【一般製剤名】 センナエキス (U) senna extract 【分類】 緩下剤

【単位】 ◎80mg/錠

【常用量】 1回 80mg [1回 160~240mg まで増量可能]

【用法】 就寝前 (連用する場合は1回 40~80mg を毎食後)

【透析患者への投与方法】 大部分は糞便中に排泄されるため減量の必要はない。ただし透析患者では腸管内圧上昇による虚血性大腸炎が起こりやすいので、直腸内に硬便のある場合には取り除いてから投与する (5) 【その他の報告】 炭酸カルシウムやカリウム吸着レジンは原因の硬結便には本剤よりもソルビトールなどの糖類下剤が適切である (5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【特徴】 主成分はセンノシド A, B。大腸の蠕動運動を促進し、水分の吸収を抑制して便通を促す。

【主な副作用・毒性】 腹痛, 悪心・嘔吐, 腹鳴など

【吸収】 多少吸収される (1) 吸収はわずか (U)

【F】 5%以下 (11)

【代謝】 腸内細菌により活性体のレインアンスロンとなる (1)

【排泄】 尿中排泄 5%以下, 糞中排泄 5%以下 (11)

【MW】 862.75

【透析性】 データなし (1)

【備考】 尿が黄褐色又は赤色を呈することがある。長期連用で耐性形成のため効果が減弱する (1)

【更新日】 20141220

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。