

## ▼サノレックス錠 [内]

【重要度】【透析患者に投与禁忌】 【一般製剤名】マジンドール (U) mazindol 【分類】食欲抑制剤

【単位】▼0.5mg/錠

【常用量】0.5～1.5mg/日

【用法】分1 (昼食前) ～分2～3 食前 [食事の1hr 前に投与] ■投与期間は3 ヶ月を限度

【透析患者への投与方法】重症の腎障害患者では排泄が遅延するため禁忌 (1) となっているが減量の必要はない (5)

【保存期腎不全患者への投与方法】重症の腎障害患者では排泄が遅延するため禁忌 (1) となっているが排泄に関して検討した報告はほとんどない (5)

【特徴】視床下部にある食欲中枢に作用し、摂食行動を抑制する。主要な薬理学的特性はアンフェタミン類と類似しており、依存性について留意する必要がある。使用基準を参照。

【主な副作用・毒性】依存性、肺高血圧、中枢神経症状、口渇感、消化器症状、睡眠障害

【吸収】ほぼ完全に吸収される (1)

【tmax】2hr (1)

【代謝】主として肝代謝され、イミダゾールの開裂や酸化による代謝物が生成 (1) 主代謝物に活性はない (1)

【排泄】尿中未変化体排泄率 4.5% [po, 72hr まで] (1)

【t1/2】約9hr (1) 10～13hr (U)

【蛋白結合率】60% (1)

【Vd/F】450L/man (1)

【MW】284.74

【透析性】資料なし (1) Vd が大きく効率的には除去されないと思われる (1)

【OW 係数】資料なし (1)

【効果発現時間】

【効果持続時間】8～15hr (U)

【禁忌】

【更新日】20160204

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。