

▼アロカ、▼ロノックカプセル [内] <製造中止>

【重要度】<製造中止> 【一般製剤名】オルノプロスチル ornoprostil 【分類】プロスタグランジン系胃潰瘍治療剤

【単位】▼2.5mcg/カプセル

【常用量】20mcg

【用法】1日4回食間と寝る前

【透析患者への投与方法】減量する必要なし (5)

【保存期腎不全患者への投与方法】減量する必要なし (5)

【特徴】

【主な副作用・毒性】

【吸収】65%が吸収されるが、結晶中に見変化体は検出されない (1)

【tmax】

【代謝】 α 鎖の β 酸化、5員環の異性化、 ω 鎖の水酸化やカルボキシル化を受けて代謝される(1)

【排泄】投与後48時間で尿中に約20%、糞中に約70%が排泄される (1)

【t1/2】

【透析患者のt1/2】

【蛋白結合率】

【分布】投与後、大部分が消化管内に認められ、わずかに肝臓、暴行、小腸等への分布が見られる(1)

【MW】410.55

【透析性】

【TDMのポイント】

【O/W係数】

【pKa】

【更新日】20080710

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。