

▼オルセノン軟膏【外】

【重要度】 【一般製剤名】トレチノイン トコフェリル Tretinoin Tocoferil 【分類】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

【単位】▼30g/本 [0.25%]

【用法】潰瘍面を清拭後、1日1～2回ガーゼなどにのぼして貼布するか又は患部に直接塗布する

【特徴】ビタミンAとビタミンEの合成化合物。褥瘡、皮膚潰瘍〔熱傷潰瘍、糖尿病性潰瘍、下腿潰瘍〕に用いられる。マクロファージ遊走促進作用、繊維芽細胞増殖促進作用、肉芽形成作用および結合組織成分の生成促進作用、血管新生促進作用がある。褥瘡治療においては、黄色期～赤色期で感染のない創に用いて肉芽増殖作用を期待する。

【主な副作用・毒性】皮膚の発赤・紅斑・掻痒・疼痛・刺激感、出血、感染

【吸収】皮膚からの吸収は認めない (1)

【MW】713.13

【O/W係数】LogP=6.614 と脂溶性 (11)

【更新日】20230131

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。