

△フロジジン外用液5% [外]

【重要度】 【一般製剤名】カルプロニウム塩化物水和物 carpronium chloride hydrate 【分類】脱毛症・白斑用剤

【単位】△30mL/本

【常用量】■脱毛症、乾性脂漏：1日2～3回塗布，あるいは被髪部全体にふりかけ軽くマッサージ■尋常性白斑：1日3～4回適量を患部に塗布

【特徴】緑色のアルコール性外用液。皮膚から速やかに吸収されアセチルコリン様作用により局所の血管を拡張し，血流を増大させ，代謝を活発にして毛根機能を賦活させる。機能低下状態にある毛のうに作用して発毛を促進する。皮膚浸透性がよく，コリンエステラーゼの抵抗性のため作用は持続的である。局所血管拡張作用はアセチルコリンの約10倍。

【副作用】過敏症、アセチルコリン様作用（刺激痛，局所発汗，熱感，全身性の発汗，それに伴う悪寒，戦慄，嘔気，嘔吐）

【吸収率】経皮的に5～15% (1)

【MW】213.70

【備考】湯あがりの後などに使用すると副作用が強くなる傾向があり，副作用があらわれたときは，使用部位を水等で洗い流す。眼には使用しない。

【更新日】20120321

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。