

▼エラスチーム錠 [内]

【重要度】 【一般製剤名】 エラスターゼ elastase 【分類】 脂質代謝異常改善剤

【単位】 ▼1800 エラスターゼ単位錠

【常用量】 3錠/日 [最大6錠]

【用法】 1日3回食前

【透析患者への投与方法】 透析患者の投与方法に言及した文献なし (5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 腎不全患者の投与方法に言及した文献なし (5)

【特徴】 プタのすい臓から製したもので、エラスチンを分解し、カゼイン、フィブリン及び変性コラーゲンなども分解する。動脈壁への血清脂質成分の移行を調節し、血清脂質異常を改善する。尿蛋白減少作用もあるが作用機序は不明。

【主な副作用・毒性】 過敏症、下痢、胃障害、食欲不振、悪心、便秘、腹部膨満感、胃部不快感など

【tmax】 12hr (1)

【代謝】 肝で蛋白分解酵素により代謝 (1)

【排泄】 尿中回収率 98.6%、糞便中回収率 2% [ラット, iv, 168hr まで] (1)

【t1/2】 19.4hr (1)

【蛋白結合率】 不明、 α 2-マクログロブリン、 α 1-アンチトリプシンと結合 (1)

【透析性】 資料なし (1) おそらく透析性は低い (5)

【TDM のポイント】 TDM の対象にはならない 【O/W 係数】 資料なし (1)

【備考】 酸に不安定のため、腸溶錠

【更新日】 20150126

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。