

◎エンシュア・リキッド・△H [内]

【重要度】★ 【分類】経腸栄養剤 [経口・経管両用]

【単位】◎250mL/缶 [250kcal], △H 250mL/缶 [375kcal]

【常用量】1500～2250mL/日

【用法】1日1～数回■DEHPを含まない栄養セット及びフィーディングチューブ等を使用

【透析患者への投与方法】腎障害のある患者には慎重投与 (1) 高K血症, 微量元素の不足, VAの蓄積などに注意しながら投与する (5)

【保存期腎不全患者への投与方法】腎障害のある患者には慎重投与 (1) 高K血症, 微量元素の不足, VAの蓄積などに注意しながら投与する (5)

【特徴】1kcal/mLに調整されたリキッドタイプの半消化体経腸栄養剤。浸透圧が約360mOsm/Lと体液の浸透圧に近く、乳糖を含まないので下痢や腹部膨満感などの発現頻度は低い。

【主な副作用・毒性】ショック, アナフィラキシー, 下痢, 肝障害, 貧血, 発疹, 発熱, 乏尿など

【安全性に関する情報】牛乳由来のカゼインが含まれているためショック, アナフィラキシーに注意 (1)

【備考】下痢などの副作用が現れたら低濃度、低速度で様子を見る。NPC/N比=157

【更新日】20201223

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。