
△五積散エキス顆粒 (63) [ツムラ] [内]

【重要度】 【一般製剤名】 【分類】 漢方製剤**【単位】 △2.5g/包****【常用量】 7.5g/日****【用法】 分2～3 [食前又は食間]****【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (1) 【その他の報告】 冷えを伴う HD 患者の肩関節症に 5g/日で有効 [ただし数か月服用] (福原慎也; 第 85 回大阪透析研究会 2015)****【保存期 CKD 患者への投与方法】 減量の必要なし (1)****【特徴】 慢性に経過し、症状の激しくない胃腸炎、腰痛、神経痛、関節痛、月経痛、頭痛、冷え症、更年期障害、感冒に用いる。****【副作用】 偽アルドステロン症、ミオパシー、過敏症、頻脈、不眠、消化器症状、排尿困難など****【更新日】 20150915**

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。