◎抑肝散エキス顆粒（54）［ツムラ］[内]

【重要度】　【一般製剤名】　　【分類】漢方製剤
【単位】◎2.5g/包
【常用量】7.5g/日
BPSD には少量（2.5～5g）から開始も可
【用法】分 2～3［食前又は食間］
【透析患者への投与方法】常用量（5）
【保存期 CKD 患者への投与方法】常用量（5）
【特徴】虚弱な体質で神経がたかぶるものの神経症、不眠症、小児夜なき、小児疳症に適用.
【主な副作用・毒性】心不全，間質性肺炎，肝機能障害，傾眠，倦怠感，ミオパシー，横紋筋融解症，過敏症など
【安全性に関する情報】フルドーズ適用，他のカリウム低下作用のある薬物との併用時，低 Alb 血症時などは特に低 K 血症のモニターが必要（Shimada S, et al: BMJ Open 2017 PMID: 28619768）
代謝性アルカローシスを伴い血清 K1.8mEq/L となった高齢者の症例（西山直樹，他: 日本老年医学会雑誌 48: 553-555, 2011）
【吸収】
【F】
【tmax】
【Cmax】
【代謝】
【排泄】
【t1/2】
【蛋白結合率】
【透析患者の蛋白結合率】
【Vd】
【透析患者の Vd】
【分布】
【MW】
【透析性】
【透析 CL】
【透析時 t1/2】
【主な臨床報告】認知症の行動心理症状［BPSD］への有効性［メタ解析］（Matsunaga S, et al: J Alzheimers Dis 2016 PMID: 27497482）
【備考】レビー小体型認知症患者の幻視や精神症状を改善する（Iwasaki K, et al: J Clin Psychiatry 66:1612-1613, 2005）
【更新日】20231229

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。
※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。