

◎黄連解毒湯エキス顆粒 (15) [ツムラ] [内]

【重要度】 【分類】 漢方製剤

【単位】 ◎2.5g/包

【常用量】 7.5g/日

【用法】 分2〜3 [(食前又は食間]

【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (5) 【その他の報告】 透析症例に特有の下肢のイライラ感・倦怠感 (restless leg syndrome)、不眠を改善するという報告 (臨床透析 9:115-120)、掻痒症に有効とする報告 (腎と透析 44: 283-286) あり

【保存期腎不全患者への投与方法】 減量する必要なし (5)

【特徴】 比較的体力の充実したタイプの者に用いられ、顔面紅潮、のぼせ感、不安、頭痛、不眠、肩凝り、時に鼻出血を目標として用いられる。脳血管性痴呆に有望であるという報告がある。

【主な副作用・毒性】 肝障害、胃障害、下痢など。長期投与で腸間膜静脈硬化症。

【更新日】 20140104

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。