

## ▼ダルメートカプセル [内]

- 【重要度】 【一般製剤名】フルラゼパム塩酸塩 (U) flurazepam hydrochloride
- 【分類】睡眠導入剤 [BZ系・長時間型]
- 【単位】▼10mg・▼15mg/Cap
- 【常用量】10～30mg/回
- 【用法】寝る前・手術前
- 【透析患者への投与方法】減量の必要なし (3,12)
- 【PD】減量の必要なし (12)
- 【CRRT】減量の必要なし (12)
- 【保存期 CKD 患者への投与方法】減量の必要なし (3) 【その他の報告】作用が強くあらわれるおそれがあり慎重投与 (1)
- 【特徴】不眠症及び麻酔前投薬に用いられるベンゾジアゼピン系催眠剤。
- 【主な副作用・毒性】眠気、ふらつき、倦怠感、口渇、依存性、呼吸抑制、一過性前向き健忘、過敏症、消化器症状、肝機能障害など
- 【吸収】100%吸収され、70%が初回通過効果を受ける (11)
- 【tmax】1hr (1)
- 【代謝】代謝物 N-脱アルキル体には活性がある (1) 酸化的に代謝された後、グルクロン酸抱合される (U)
- 【排泄】尿中未変化体排泄率 0.3%以下 (1) 尿中回収率 32～59%でエタノール体がメインで 86% [po, 48hr まで] (1)
- 【t1/2】未変化体：5.9hr, N-脱アルキル体：23.6hr (1) N-脱アルキル体 47～100hr (11,12)
- 【蛋白結合率】未変化体 97% (11) 脱アルキル化体 97% (U) 98% (11)
- 【Vd】3.4L/kg (12)
- 【MW】424.34
- 【透析性】資料なし (1) 蛋白結合率が高いため、除去されないと思われる (1)
- 【OW 係数】LogP=0.37 [1-オクタノール/buffer, pH7.4] (1)
- 【相互作用】リトナビルと併用禁忌 [CYP3A4] (1)
- 【更新日】20151228

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。