

▼アズマネックスツイストヘラー [外]

【重要度】 【一般製剤名】 モメタゾンフランカルボン酸エステル (U) mometasone furoate 【分類】 吸入ステロイド剤
【単位】 ▼100 μ g/回 [60回吸入用]
【常用量】 1回1吸入1日2回 (200 μ g/日) [最大800 μ g/日]
【用法】 1日2回
【透析患者への投与方法】 常用量 (1)
【保存期CKD患者への投与方法】 常用量 (1)
【特徴】 グルココルチコイド受容体に対する親和性が高い。肺への送達率が約40%で全身吸収率が低い。
【主な副作用・毒性】 アナフィラキシー、過敏症、口腔カンジダ症、嗄声、咽頭部症状、味覚異常など
【F】 1% (1) 1%未満 (U)
【代謝】 CYP3A4で代謝される (U) 広範な代謝を受け、6 β 水酸化体の生成にはCYP3A4が関与 (1)
【排泄】 尿中に8%、糞便中に74%回収 (U) 尿中未変化体排泄率24.3% [iv] (1) 【CL】 50L/hr [iv] (1)
【t1/2】 5hr [iv] (U)
【蛋白結合率】 98~99% (U)
【Vd】 152L/man [iv] (1,U)
【MW】 521.43
【透析性】 透析されないとされる (5) 資料なし (1)
【O/W係数】
【更新日】 20180410

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。