

▼レザルタス配合錠 [内]

【重要度】 【一般製剤名】 オルメサルタン+アゼルニジピン 【分類】 ARB+Ca 拮抗薬配合剤

【単位】 ▼LD, ▼HD

【常用量】 1日1回, 1回1錠

【用法】 分1朝食後

【透析患者への投与方法】 低血圧, 高K血症などに注意して適用 (1)

【保存期CKD患者への投与方法】 低血圧, 急激な腎機能の悪化, 高K血症に注意して適用 (1)

【特徴】 ARB+Ca 拮抗薬の合剤. HDはLDのそれぞれ2倍量含有. 過度の血圧低下のおそれ等があり, 本剤を高血圧治療の第一選択薬としない.

【主な副作用・毒性】 血管浮腫, 腎機能障害, 高K血症, 横紋筋融解症, 失神, 肝障害, 房室ブロックなど

【F】

【tmax】

【代謝】

【排泄】

【t1/2】

【蛋白結合率】

【Vd】

【透析性】

【O/W係数】

【備考】 メトホルミンやカモスタットとの一包化は避ける (1)

【更新日】 20150824

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。