

△ザラカム配合点眼液 [外]

【重要度】 【一般製剤名】 ラタノプロスト+チモロールマレイン酸塩 latanoprost+timolol maleate 【分類】 緑内障・高眼圧症治療薬 [PG+ β -blocker]

【単位】 Δ 2.5mL/本 [ラタノプロスト 0.005%+チモロール 0.5%]

【常用量】 1回1滴, 1日1回

【用法】 1日1回を超えて使用しない

【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 減量の必要なし (1)

【特徴】 緑内障に適用される, β 遮断薬と PG の配合剤、房水流出促進と房水産生抑制の 2 つの作用で眼圧を下降させる。

【主な副作用・毒性】 虹彩色素沈着, 呼吸困難, 心不全, 結膜障害, 角膜障害, 眼瞼炎, 視野異常など

【F】

【tmax】

【代謝】 ラタノプロスト: β 酸化される (1) チモロール: CYP2D6 で代謝 (1)

【排泄】 代謝物として主に尿中に回収 (1) 【CL】 血漿チモロールクリアランス 7.3mL/min/kg (1)

【蛋白結合率】 ラタノプロスト: 53~87%, チモロール: 60% (1)

【Vd】 チモロール 3.5L/kg [iv] (1)

【MW】 ラタノプロスト 432.59, チモロールマレイン酸塩 432.49

【透析性】

【O/W 係数】

【備考】 開封前冷蔵所保存, 開封後は室温保存で, 使用期限は開封後 4 週間。

【更新日】 20180403

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配言を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。