

▼エリザスカプセル外用・▼点鼻粉末 [外]

- 【重要度】 【一般製剤名】 デキサメタゾン シペシル酸エステル dexamethasone cipeclate 【分類】 粉末噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤 [ステロイド剤]
- 【単位】 ▼400 μ g/Cap, ▼200 μ g/puff [28回分]
- 【常用量】 1回1カプセル
- 【用法】 1日1回鼻腔に噴霧 [専用噴霧器を使用し、息を止めた状態で鼻腔内に4回噴霧]
- 【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (1)
- 【保存期腎不全患者への投与方法】 減量の必要なし (1)
- 【特徴】 アレルギー性鼻炎に用いられる1日1回投与の鼻噴霧用ステロイド薬。点鼻粉末は14日間分を噴霧器に充填した定量噴霧式の残数カウンター付き点鼻粉末剤
- 【主な副作用・毒性】 アナフィラキシー様症状、鼻部・咽頭不快感、ALT上昇、TG上昇など
- 【吸収】 400 μ g点鼻では血中濃度は検出限界以下 (1)
- 【F】 2.7% [点鼻], 63.3% [吸入], 1.4% [po] (1)
- 【代謝】 カルボキシルエステラーゼ (CES) により主要活性代謝物であるDX-17-CPCに加水分解され、さらにCYP3A4、CYP1A2及びCESにより代謝 (1)
- 【排泄】 尿中未変化体排泄率0.023% [点鼻, 72hrまで] (1) 尿中活性代謝物 (DX-17-CPC) 排泄率0.020% [点鼻, 72hrまで] (1) 静注では90%以上が糞便中に排泄 [ラット] (1)
- 【t1/2】
- 【蛋白結合率】 95.9%以上 (1)
- 【Vd】 資料なし (1)
- 【MW】 570.69
- 【透析性】 資料なし (1)
- 【OW係数】 油相の分配 (1)
- 【更新日】 20121229

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。