

○潤腸湯エキス顆粒 (51) [ツムラ] [内]

【重要度】 【一般製剤名】 【分類】 漢方製剤

【単位】 〇2.5g/包

【常用量】 7.5g/日

【用法】 分2〜3 [食前又は食間]

【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

難治性便秘である虚証の透析患者に7.5g/日を適用してブリストルスケールと気鬱スコアが改善 (福原真也: 日東医誌 66: 296-301, 2015)

【保存期腎不全患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【特徴】 主に便秘に適用.

【主な副作用・毒性】 間質性肺炎, 偽アルドステロン症, ミオパシー, 肝障害, 消化器症状など

【更新日】 20190701

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。