透析患者 3型する薬剤情報 医療法人仁真会 白鷺麻宗 薬剤所

## ▼ヒドロクロロチアジド錠 [内]

【重要度】 【一般製剤名】ヒドロクロロチアジド(U) Hydrochlorothiazide 【分類】降圧利尿剤[サイアザイド]

【単位】▼12.5mg・▼25mg/錠

【常用量】1回25~100mgを1日1~2回

【用法】1日1~2回

【透析患者への投与方法】無尿の患者には禁忌(1)

【その他の報告】通常効果がないので避ける(17)

【保存期 CKD 患者への投与方法】重篤な腎障害のある患者には慎重投与(1)

【その他の報告】GFR 30mL/min 未満では効果が得られないことが多く、ループ利尿剤と併用する(12)

GFR>50mL/min: 12.5~50mgを1日1~2回, GFR 10~50mL/min: 12.5~25mgを1日1回, GFR 10mL/min未満: 効果がないことが多いので避ける(17) 【特徴】サイアザイド系利尿薬 高血圧症,心性浮腫、腎性浮腫、肝性浮腫、月経前緊張症、薬剤性浮腫に対して用いられる. 遠位尿細管に作用して尿中 Ca 排泄を低下させるため、Ca 結石の予防に効果があるかもしれない(U)

【主な副作用・毒性】呼吸困難、発疹、白血球減少、血小板減少、黄疸、低 Mg 血症、低クロール性アルカローシス、腹痛、知覚異常、不整脈、起立性低血圧、高 Ca 血症など

【モニターすべき項目】血糖、BUN、Cre、UA、血圧、血清脂質、K

[tmax] 2hr (1)

【代謝】ほとんど代謝を受けない(11)

【排泄】尿中回収率 61~66% [po, 24hr まで] (1)

[t1/2] 15hr (U) 10hr (1)

【蛋白結合率】資料なし(1)

【Vd】資料なし (1)

[MW] 297.74

【透析性】資料なし(1)

【O/W 係数】資料なし(1)

【効果発現時間】2hr(U)

【効果持続時間】6~12hr (U)

【備考】 旧販売名:ニュートライド

【更新日】20240724

※正確は情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適別性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、 直接または間路がに生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。 ※本サイトに掲載の記事・写真などの無期産載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。