

○ミンクリア内用散布液0.8% [内]

【重要度】 【一般製剤名】 l-メントール l-menthol 【分類】 胃蠕動運動抑制剤
【単位】 ○20mL/シリンジ [0.8%]
【常用量】 1回 20mL
【用法】 内視鏡の鉗子口より胃幽門前庭部に行きわたるように散布 [経口投与不可]
【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (5)
【保存期腎不全患者への投与方法】 減量の必要なし (5)
【特徴】 細胞膜上にある電位依存性L型カルシウムチャンネルに結合し、蠕動運動抑制効果を示す。
【主な副作用・毒性】 下痢, 血中アミラーゼ増加, 白血球数増加, 上室性期外収縮, 心室性期外収縮など
【tmax】 0.4hr (1)
【代謝】 グルクロン酸抱合体および水酸化体にて代謝 (1) CYP3A4, 2B6 が関与 (1)
【排泄】 代謝物として尿中, 糞便中に排泄 (1)
【t1/2】 1.8hr (1)
【蛋白結合率】 84% (1)
【MW】 156.27
【透析性】 低いと思われる (5)
【備考】 室温保存
【更新日】 20171219

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。