透析患者に関する薬剤情報 医療法人仁真会 白鷺荫院 薬剤科

## ◎キョウニン水 [内]

【重要度】 【一般製剤名】キョウニン水 apricot kernel water 【分類】鎮咳・去痰薬

【単位】◎mL

【常用量】3mL/日 [最大1回2mL, 1日6mL]

【用法】分3~4

【透析患者への投与方法】減量の必要なし(5)

【保存期腎不全患者への投与方法】減量の必要なし(5)

【特徴】鎮咳去痰薬として内服する。大量に服用すると青酸中毒を起こすので、特に小児への投与は避ける。

【主な副作用・毒性】大量投与で悪心・嘔吐,下痢,めまい,頭痛,瞳孔散大,心悸亢進,過呼吸,チアノーゼ,意識喪失,窒息性痙攣等の症状

【更新日】20121030

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性こついていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、 直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添け文書やインタビューフォーム等でご確認ください。 ※本サイトに掲載の記事・写真などの無期転載・配言を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法が以て国際条約により保護されています。