

◎ダイアニール【N】PD-4 腹膜透析液 [注]

【重要度】 【一般製剤名】 Dianeal 【分類】 腹膜透析液

【単位】 ◎1.5%, ◎2.5% (◎1L, ◎1.5L, ◎2L, ◎2.5L, ◎5L) 2.5Lまではそれぞれシングル・ツイン・UV ツインあり

【常用量】

【用法】

【特徴】 Ca 濃度 2.5mEq/L と低くしてCKD-MBD の管理を容易にする。しかし低PHT の患者に長期的に使うと骨塩量が低下することが危惧される(重松隆: 透析会誌 1996)

【主な副作用・毒性】 低血圧, ショック, EPS, 血清電解質異常など

【O/W 係数】

【更新日】 20151126

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。