

○ロトリガ粒状カプセル [内]

- 【重要度】 【一般製剤名】 イコサペント酸エチル+ドコサヘキサエン酸エチル (U) EPA+DHA 【分類】 EPA・DHA 製剤
- 【単位】 ○2g/包
- 【常用量】 2g/日 [最大 4g]
- 【用法】 1日1回食直後 [4gの場合は1日2回] ■食直後にかまわずに服用する
- 【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (1)
- 【保存期 CKD 患者への投与方法】 減量の必要なし (1)
- 【特徴】 高TG血症治療に用いられるオメガ3脂肪酸エチル製剤。出血している患者には禁忌。TGの低下作用は本剤2gとEPA1.8gが同等 (1)
- 【主な副作用・毒性】 発疹、薬疹、そう痒、高血糖、めまい、頭痛、消化器症状、肝機能障害など
- 【tmax】 6hr (1)
- 【代謝】 加水分解されて吸収後、脂肪酸利用・代謝経路に入る (1)
- 【排泄】 主に呼吸から排泄され、尿中回収率はわずか [ラット] (1)
- 【t1/2】 資料なし (1)
- 【蛋白結合率】 99%以上 (1)
- 【Vd】 資料なし (1)
- 【MW】 EPA 330.50, DHA 356.54
- 【透析性】 除去されないと思われる (5)
- 【相互作用】 抗凝固薬、抗血小板薬を投与中の患者では慎重投与 (1)
- 【備考】 LDL-C, HDL-Cは低下しない (平光 伸也, 他: Prog Med 33: 1999-2004, 2013)
- 【更新日】 20200305

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。