

▼バイカロン錠 [内]

【重要度】 【一般製剤名】メフルシド mefruside 【分類】降圧利尿剤

【単位】▼25mg/錠

【常用量】25～50mg/日

【用法】1日1回朝または1日2回朝・昼

【透析患者への投与方法】無尿の患者には禁忌 (1)

【保存期CKD患者への投与方法】重篤な腎障害患者には慎重投与〔低K血症のおそれ〕(1)

【特徴】ベンゼンスルホンアミド系の利尿剤。緩徐で持続的な利尿効果を示すので、慢性浮腫の治療にも適用される。

【主な副作用・毒性】間質性肺炎, 低Na血症, 低K血症, 高尿酸血症, 高血糖, 消化器症状, めまいなど

【F】

【tmax】2.6hr (1)

【代謝】尿中代謝物は、ラクトン型とそれが開環したヒドロキシカルボン酸型 (1) 主代謝物にも同等の活性があり消失は未変化体より遅い (1)

【排泄】尿中回収率は未変化体0.49%, ラクトン型13.1%, 開環したヒドロキシカルボン酸型46.2% [po] (1) 【CL】全身22.5～129L/hr [po] (1) 腎CL2.5～5.4mL/min (1)

【t1/2】ラクトン型11.4hr, ヒドロキシカルボン酸型10.3hr (1)

【蛋白結合率】82～85% [イヌ] (1)

【Vd】314～518L/man [po] (1)

【MW】382.88

【透析性】資料なし (1)

【OW係数】39 [1-オクタノール水系, pH7.0] (1)

【相互作用】デスマプレシンと併用禁忌 (1)

【更新日】20191007

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。