▼デノタスチュアブル配合錠　［内］

【重要度】★★　【一般製剤名】沈降炭酸カルシウム＋コレカルシフェロール＋炭酸マグネシウム　precipitated calcium carbonate/cholecalciferol/magnesium carbonate　【分類】カルシウム補給剤

【単位】▼錠［沈降炭酸 Ca +762.5mg＋コレカルシフェロール 0.005mg＋炭酸マグネシウム 59.2mg］

【常用量】1 日 1 回 2 錠を経口投与

【用法】かみ砕くか口の中で溶かして服用する

【透析患者への投与方法】ビタミン D 活性化障害があるので，他の方法で Ca を補給する（1）

【保存期 CKD 患者への投与方法】腎機能障害の程度によるが，ビタミン D 活性化障害があれば他の方法で Ca を補給することを考慮（1）

【特徴】ヒト型 RANKL モノクローナル抗体のデノスマブ［ランマーク，プラリア］投与時の低 Ca 血症を予防・治療するための製剤.

【主な副作用･毒性】便秘，下痢，発疹，掻痒，悪心，嘔吐，腹部不快感

【蛋白結合率】

【Vd】

【透析性】

【相互作用】キノロン，テトラサイクリンの吸収阻害（1）

【更新日】20250513

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。