

◎キシロカインゼリー2% [外]

【重要度】 【一般製剤名】リドカイン lidocaine 【分類】粘滑・表面麻酔剤

【単位】◎30mL/本 [2%]

【常用量】■尿道麻酔科成人男子：200～300mg（10～15mL），女性60～100mg（3～5mL）を使用■気管内挿管：適当量

【特徴】2%キシロカイン含有の局所表面麻酔剤。カルボキシメチルセルロースナトリウムでゼリー化。

【主な副作用・毒性】ショック，意識障害，振戦，痙攣，眠気，不安，興奮，霧視，悪心・嘔吐，皮膚過敏症など

【MW】234.34

【備考】保存剤としてメチルパラベン，プロピルパラベン含有 (1) 清潔に扱い，開封後2か月を目安に交換（2008, ICT）

【更新日】20121018

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。