○ルリコンクリーム・△液・▼軟膏　［外］

【重要度】　【一般製剤名】ルリコナゾール　Luliconazole　【分類】抗真菌外用剤［イミダゾール］
【単位】○クリーム 10g/本・△液 10mL/本・▼軟膏 10g/本
【常用量】1 日 1 回患部に塗布
【用法】
【透析患者への投与方法】常用量（1）
【保存期 CKD 患者への投与方法】常用量（1）
【特徴】白癬の治療に用いられる外用剤．皮膚糸状菌（Trichophyton 属，Microsporum 属，Epidermophyton 属），Candida 属真菌，Malassezia 属真菌に対して抗真菌活性を有する．
【主な副作用･毒性】皮膚の過敏症
【F】
【tmax】
【排泄】尿中に未変化体は検出されない（1）
【MW】354.28
【O/W 係数】
【更新日】20230131

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。
※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。