

## ▼アドビオール錠 [内]

【重要度】 【一般製剤名】 プフェトロール塩酸塩 bufetolol hydrochloride 【分類】 狭心症, 洞性頻脈治療剤 [β遮断薬]

【単位】 ▼5mg/錠

【常用量】 15mg/日

【用法】 1日3回

【透析患者への投与方法】 慎重投与 (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 慎重投与 (1)

【特徴】 交感神経β遮断剤で狭心症, 洞性頻脈に適用される。

【主な副作用・毒性】 心不全, 徐脈, 眠気, めまい, 頭痛, 下痢, 食欲不振, 発疹, 喘息, 涙液分泌減少など

【安全性に関する情報】 手術前24時間は投与しないことが望ましい (1)

【F】 資料なし (1)

【tmax】 1.3hr (1)

【代謝】 尿中の代謝物は水酸化体およびそのグルクロン酸抱合体, テトラヒドロフルフリル基の開環体のグルクロン酸抱合体 [ラット] (1)

【排泄】 尿中未変化体排泄率 8% [24hr まで] (1)

【t1/2】 1.5hr (1)

【蛋白結合率】 20% (1)

【Vd】 資料なし (1)

【MW】 359.89

【透析性】 資料なし (1)

【薬物動態】 日本人の PK の記述 (楠岡英雄 診断と治療 68: 2016-20, 1980)

【O/W 係数】 0.3506 [クロロホルム/水系, pH7.0] (1) 【pKa】 10.0

【相互作用】 交感神経抑制剤, 心機能を抑制する薬剤などと併用注意 (1) 血糖降下剤の作用増強, あるいは低血糖に伴う交感神経系の症状をマスクしたり, β遮断作用により低血糖の回復を遅らせる (1)

【作用発現時間】 10分 [イヌ, 経口] (1)

【作用持続時間】 5hr [イヌ, po] (1)

【更新日】 20151209

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。