

## ▼エリスパン錠 [内] &lt;2024.3 販売中止&gt;

【重要度】 【一般製剤名】フルジアゼパム Fludiazepam 【分類】マイナートランキライザー

【単位】▼0.25mg/錠

【常用量】0.75mg/日■高齢者は少量から開始

【用法】1日3回

【透析患者への投与方法】減量の必要なし (5) 【その他の報告】排泄が遅延するおそれがあるため腎障害患者には慎重投与 (1)

【保存期CKD患者への投与方法】減量の必要なし (5) 【その他の報告】排泄が遅延するおそれがあるため腎障害患者には慎重投与 (1)

【特徴】不安・緊張除去作用が強く、ねむけ・脱力感と関連する作用が弱いという特性を有するマイナートランキライザー。

【主な副作用・毒性】依存性、錯乱、眠気、めまい・ふらつき、頭痛、焦躁感、振戦、疲労・倦怠・脱力感、消化器症状、発疹など。自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させない。

【F】資料なし (1)

【tmax】1hr (1)

【代謝】代謝物1-デスマチル体 [活性は未変化体より弱い]、1-デスマチル-3-ヒドロキシ体 [活性は未変化体よりかなり弱い] (1)

【排泄】尿中回収率14% [ラット, 48hr まで] (1)

【t1/2】23hr (1)

【蛋白結合率】資料なし (1)

【Vd】資料なし (1)

【MW】302.73

【透析性】資料なし (1)

【OW係数】589 [1-オクタノール水系] (1)

【相互作用】中枢神経抑制剤と併用注意 (1)

【備考】最大30日処方。

【更新日】20230621

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。