

▼エリミン錠 [内] <販売中止>

【重要度】 【一般製剤名】ニメタゼパム nimetazepam 【分類】睡眠導入剤 [BZ系]

【単位】▼3mg・▼5mg/錠

【常用量】3～5mg/日

【用法】寝る前

【透析患者への投与方法】腎障害のある患者は慎重投与 [排泄が遅延するおそれ] (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】腎障害のある患者は慎重投与 [排泄が遅延するおそれ] (1)

【特徴】ニトラゼパム類似の BZ 系睡眠導入剤。

【主な副作用・毒性】依存性、刺激興奮、錯乱、一過性前向き健忘、ふらつき、頭痛、構音障害、倦怠感、肝機能障害、消化器症状など。本剤の影響が翌朝以後に及ぶことがあるので自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意。

【F】資料なし (1)

【tmax】1～4hr (1)

【代謝】血中に代謝物として1-デスメチル体と3-ヒドロキシ体があり、共に活性は弱い (1)

【排泄】資料なし (1)

【t1/2】12hr, 21hr と二相性 (1)

【蛋白結合率】資料なし (1)

【Vd】資料なし (1)

【MW】295.29

【透析性】資料なし (1)

【OW 係数】資料なし (1) 【pKa】2.62±0.03

【相互作用】中枢神経抑制剤と併用注意 (1)

【更新日】20170419

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。