

## ▼ポルトラック原末 [内]

【重要度】 【一般製剤名】ラクチトール水和物 lactitol hydrate 【分類】高アンモニア血症治療剤

【単位】▼6g/包

【常用量】18g/日から開始，1日2～3回程度の軟便がみられる量を投与し，最大36g/日

【用法】1日3回 [用時，水に溶解して経口投与]

【透析患者への投与方法】常用量 (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】常用量 (1)

【特徴】非代償性肝硬変に伴う高アンモニア血症治療に用いられる。腸管内 pH の低下作用，アンモニアの産生・吸収抑制，腸管内輸送能亢進作用により，血中アンモニア濃度を低下させる。

【主な副作用・毒性】下痢，腹部膨満，悪心，腹痛，放屁，食欲不振，かゆみ，倦怠感など

【安全性に関する情報】

【吸収】ほとんど吸収されない (1)

【tmax】1hr (1)

【代謝】腸内細菌により代謝 (1)

【排泄】尿中に2%回収 (1)

【t1/2】2～3hr (1)

【蛋白結合率】結合しない (1)

【Vd】資料なし (1)

【MW】362.33

【透析性】資料なし (1) ダイアライザは通過するが，透析性は臨床問題にならない (5)

【O/W 係数】水相に分配 (1)

【相互作用】α-GI：消化器系副作用増強のおそれ (1)

【備考】1g あたり 2kcal のエネルギー (1)

【更新日】20170112

※正確な情報を掲載するように努力していますが，その正確性，完全性，適切性についていかなる責任も負わず，いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし，それらを利用した結果，直接または間接的に生じた一切の問題について，当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は，日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。