

**▼ジオン注 [注]**

【重要度】【透析患者に投与禁忌】 【一般製剤名】硫酸アルミニウムカリウム水和物／タンニン酸 Aluminum Potassium Sulfate Hydrate/Tannic Acid 【分類】内痔核硬化療法剤

【単位】▼硫酸アルミニウムカリウム水和物 400mg [4%] / タンニン酸 14mg [0.14%]

【常用量】添付文書参照

【用法】粘膜下投与

【透析患者への投与方法】アルミニウムの排泄が遅延するため禁忌 (1)

【その他の報告】アルミニウム濃度が2週間以上高値を持続する症例はなく適用できる可能性がある (岡本 亮, 他: 透析会誌 S1: 630, 2013)

平均31mLの使用にて一過性に血中アルミニウム濃度が上昇するが、3か月後にはもとのレベルまで低下していた (Tsunoda A, et al: Surg Today 44: 2314-7, 2014 PMID: 24817127)

【保存期 CKD 患者への投与方法】アルミニウムの排泄が遅延するおそれがあり、尿量を確保し、慎重投与 (1)

【特徴】内痔核治療剤。中国で承認されている消痔靈に由来する内痔核硬化療法剤。

【主な副作用・毒性】血圧低下、徐脈、直腸潰瘍、リンパ球減少、白血球增多、好酸球增多、尿酸上昇、尿閉、気分不良など

【MW】474.39

【更新日】20211014

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適合性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院はいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインターネットフォーム等をご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断複数・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。