

## ▼ザガーロカプセル [内]

【重要度】 【一般製剤名】デュタステリド Dutasteride 【分類】男性型脱毛症治療薬 [5 $\alpha$ 還元酵素阻害薬]

【単位】▼0.1mg・▼0.5mg/cap

【常用量】通常 0.1mg/日, 必要に応じ 0.5mg/日

【用法】1日1回

【透析患者への投与方法】常用量 (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】常用量 (1)

【特徴】テストステロンをジヒドロテストステロン (男性型脱毛症に関与する主なアンドロゲン) へ変換する 1 型及び 2 型 5 $\alpha$ 還元酵素を阻害。

【主な副作用・毒性】肝機能障害, 黄疸, 発疹, かゆみ, 頭痛, めまい, 性功能不全, 味覚異常, 女性化乳房, 精巣痛, 体毛の脱落, 多毛, 消化器症状など

【安全性に関する情報】本剤は経皮吸収されるため, 女性や小児はカプセルから漏れた薬剤に触れない (1)

【F】59% (1)

【tmax】1.5hr (1)

【代謝】CYP3A4/5 で代謝 [水酸化] (1)

【排泄】尿中未変化体排泄率 0.1%未満 (1)

【t1/2】89~174hr [非線形] (1)

【蛋白結合率】99% (1)

【Vd/F】232~298L/body (1)

【MW】528.53

【透析性】除去されないと思われる (5)

【OW 係数】

【相互作用】CYP3A4 阻害剤との併用注意 (1) CYP2C19, 3A4 を阻害 (1)

【肝障害患者への投与方法】重度の肝障害患者には禁忌 (1)

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【備考】20 歳未満での安全性及び有効性は確立されていない (1) 6 か月で効果判定 (1)

【更新日】20230504

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、

直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。