○マーデュオックス軟膏　［外］

【重要度】★★　【一般製剤名】マキサカルシトール/ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル　Maxacalcitol／Betamethasone Butyrate Propionate　【分類】尋常性乾癬治療剤

【単位】○10g/本［マキサカルシトール 0.0025%，ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 0.05%］

【常用量】1 日 1 回適量を塗布［最大 10g/日］

【用法】1 日 1 回

4 週間を目安にその後の必要性を検討

【透析患者への投与方法】活性型ビタミン D を含有するため要注意（1）

【保存期 CKD 患者への投与方法】活性型ビタミン D を含有するため要注意（1）

【特徴】

【主な副作用･毒性】高 Ca 血症，急性腎不全，皮膚の刺激感，発疹，ステロイド性皮膚障害，毛のう炎，皮膚の感染症，尿路結石など

【安全性に関する情報】

【F】

【tmax】

【代謝】

【排泄】

【t1/2】

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】

【透析性】

【O/W 係数】

【相互作用】活性型ビタミン D，PTH 製剤，Ca 製剤による高 Ca 血症に注意（1）

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】20250524

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。