○モビコール配合内用剤 LD・▼HD　［内］

【重要度】　【一般製剤名】マクロゴール 4000（ポリエチレングリコール 4000）　Macrogol 4000　【分類】慢性便秘症治療薬［PEG］
【単位】○6.8523g/包［LD］，▼13.7046g/包［HD］
【常用量】LD として
■2～6 歳：1 回 1 包［最大 1 回 2 包，1 日 4 包まで］，1 日 1 回［1～3 回/日］●増量は 2 日以上の間隔をあけ，増量幅は 1 日 1 包まで
■7～11 歳：1 回 2 包［最大 1 回 2 包，1 日 4 包まで］，1 日 1 回［1～3 回/日］●増量は 2 日以上の間隔をあけ，増量幅は 1 日 1 包まで
■12 歳～成人：1 回 2 包［最大 1 回 4 包，1 日 6 包まで］，1 日 1 回［1～3 回/日］●増量は 2 日以上の間隔をあけ，増量幅は 1 日 2 包まで
※LD2 包＝HD1 包に読み替え
【用法】1 日 1 回■LD 1 包あたり約 60mL（HD では 120mL）の水に溶解し，溶解後は速やかに服用
【透析患者への投与方法】常用量（5）
【保存期 CKD 患者への投与方法】常用量（5）
【特徴】マクロゴール 4000 及び電解質を配合した製剤で，主にマクロゴール 4000 の物理化学的性質により高い浸透圧効果を有し消化管内に水分を保持することで用量依存的に便の排出を促進する．LD 1 包にマクロゴール 6.5625g，塩化ナトリウム 0.1754g，炭酸水素ナトリウム 0.0893g，塩化カリウム 0.0251g 含有
【主な副作用・毒性】下痢，腹痛，ショック，アナフィラキシー，発疹，血管浮腫，嘔吐，末梢性浮腫，頭痛など
【安全性に関する情報】
【F】ほとんど吸収されない（1）
【MW】2600～3800
【透析性】吸収されないため該当しなし
【O/W 係数】
【主な臨床報告】慢性便秘治療薬として推奨度が高い（Lindberg G，　et al: J Clin Gastroenterol 2011 PMID: 21666546）
【更新日】20230501

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。
※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。