

◎ケナログ口腔用軟膏 [外] (販売中止)

【重要度】 【一般製剤名】トリアムシノロンアセトニド triamcinolone acetonide 【分類】合成副腎皮質ホルモン剤

【単位】 ◎2g/本 [0.1%]

【用法】 1日1～数回・塗布

【透析患者への投与方法】常用量(1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】常用量(1)

【特徴】口腔内に対して優れた付着性と付着時間を示す口内炎及び舌炎と歯肉炎治療剤

【主な副作用・毒性】過敏症、口腔内細菌感染症、口腔内のしびれ感、味覚異常、味覚減退

【吸収】皮膚の損傷の度合いによるが、5%以下(11)

【MW】434.50

【更新日】20190304

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適合性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、

直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わざるものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインターネットフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断複数・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。