

▼ケルナックカプセル・▼細粒 [内] <販売中止>

【重要度】<販売中止> 【一般製剤名】プラウノイ抽出精製油（プラウノール） plaunotol 【分類】粘膜防衛 胃炎・胃潰瘍治療剤（植物抽出・精製製剤）

【単位】▼80mg/Cap, ▼8%細粒

【常用量】240mg/日

【用法】1日3回

【透析患者への投与方法】減量する必要はないと思われるが、透析患者の投与方法に言及した文献なし (5) 【その他の報告】透析患者のヘリコバクターピロリの除菌に AMPC500mg、ランソプラゾール 30mg と本剤 1日3カプセル投与が有効であったという報告（日腎誌 38:349-355,1996）がある

【保存期腎不全患者への投与方法】減量する必要はないと思われるが、透析患者の投与方法に言及した文献なし (5)

【特徴】phospholipase A2 系の活性化と PG を増加させることにより胃粘膜血流を増加させる。

【主な副作用・毒性】腹部不快感、便秘、AST・ALT 上昇、発疹、掻痒感など

【tmax】1.5~2hr (外国人)

【代謝】主として肝にて代謝され、ヒト血中には未変化体は検出されず、90%以上がグルクロン酸抱合体で、大部分は M-6 の抱合体 (1) 12 種類の代謝物のうち、M-6、M-4、M-3 は未変化体と同等の活性あり (1)

【排泄】尿中回収率 43~50%、中排泄率は 21~24% (1)

【t1/2】2~2.6hr (1)

【蛋白結合率】90~100% (1)

【Vd】データなし (1)

【MW】306.48

【透析性】蛋白結合率が高いため、透析で除去されにくいと思われる (5) データなし (1)

【TDM のポイント】TDM の対象にならない

【更新日】20140813

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。