

▼シングリックス筋注用 [注]

【重要度】 【一般製剤名】乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 【分類】帯状疱疹不活化ワクチン

【単位】▼溶解後 0.5mL 中 gE 抗原量として 50 μ g

【常用量】50 歳以上の成人に 1 回 0.5mL, 2 か月間隔で 2 回, 筋肉内に接種

帯状疱疹に罹患するリスクが高いと考えられる 18 歳以上の者: 0.5mL を 2 回, 1~2 ヶ月の間隔を置いて筋肉内に接種

■必ず 6 か月以内に 2 回目の接種を行う

【用法】筋肉内に接種 (上腕三角筋)

【透析患者への投与方法】通常と同じ (5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】通常と同じ (5)

【特徴】帯状疱疹ウイルスの糖蛋白 (gE 抗原) にアジュバント (AS01B) を添加したウイルスサブユニットワクチン。水痘既感染の 50 歳以上被験者において, gE 抗原特異的な CD4 陽性 T 細胞及び抗体が誘導され, 97.2% の発症予防効果が得られている。水痘の予防接種には適用できない。

【主な副作用・毒性】

【安全性に関する情報】

【O/W 係数】

【主な臨床報告】帯状疱疹発症予防効果 97.2% [50 歳以上の例での発症予防効果を検証した phase3 試験] (Lal H, et al: N Engl J Med 2015 PMID: 25916341)

70 歳以上の例での発症予防効果と PHN 予防効果を検証した phase3 試験 (Cunningham AL, et al: N Engl J Med 2016 PMID: 27626517)

65 歳以上での 2 回接種の有効性 70.1% [1 回接種で 56.9%] であり, 80 歳以上, 2 回目 6 か月以上経過して接種, 自己免疫疾患でも有効 (Izurieta HS, et al: Clin Infect Dis 2021 PMID: 33580242)

CKD でも帯状疱疹発症予防, PHN 予防に効果的 [メタ解析] (Mbinta JF, et al: Lancet Healthy Longev 2022 PMID: 36098300)

【更新日】20230712

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。