△ゾルトファイ配合注 ［注］

【重要度】　【一般製剤名】インスリン デグルデク／リラグルチド　Insulin Degludec／Liraglutide　【分類】糖尿病治療薬［持効型溶解インスリンアナログ＋ヒトGLP-1 アナログ配合注］
【単位】△デグルデク 300 単位＋リラグルチド 10.8mg/本［3mL］
【常用量】■1 ドーズ ＝ デグルデク 1 単位＋リラグルチド 0.036 mg
■初期 10 ドーズ■最大 50 ドーズ
■前治療のインスリン量により，最大 16 ドーズから開始可

【用法】1 日 1 回，一定の時刻に皮下注
■空打ち 2 ドーズ
【透析患者への投与方法】低血糖に注意して適用（1）
【保存期 CKD 患者への投与方法】低血糖に注意して適用（1）
【特徴】トレシーバとビクトーザの配合注．インスリン療法が適応となる 2 型糖尿病に適用（1 型には不可）．
【主な副作用･毒性】各成分参照
【相互作用】GLP-1 アナログによるワルファリンの効果増強の報告（1）
【備考】A 型専用注射針．使用中は室温（30℃以下）にキャップ等により遮光して保管し 3 週間以内に使用．25℃以下の保管であれば 4 週間以内に使用（1）
【更新日】20230807

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。
※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。